Quimioterapia de la cisticercosis. Resultados de 10 años ó más después del seguimiento

Clemente Robles,* Noé Vargas-Tentori,* Ana María Sedano**

Resumen

La quimioterapia de la neurocisticercosis nació lógicamente por el poco éxito de la cirugía, que generalmente es paliativa y no curativa. Prazicuantel es la única droga acerca de la cual se han publicado series de más de 100 casos y con seguimiento de más de dos años. Su uso se ha hecho universal. Razones estas para escogerlo como tema de este escrito. Se pretende contribuir a determinar su valor terapéutico en el tratamiento de la neurocisticercosis por medio del monitoreo clínico y radiológico de 50 enfermos seguidos entre 10 (72%) y más de 10 años (28%).

Se les había tratado con prazicuantel a la dosis de 50 mg por kilogramo de peso, durante 15 días. El 26% recibió un tratamiento, el 58% dos tratamientos y el 22% tres o más.

Se les estudió una vez más clínicamente y radiológicamente por tomografía axial computada de cráneo o resonancia magnética, las pruebas biológicas se hicieron únicamente en los casos sospechosos de actividad.

Como resultados se registró 68% de curaciones clínicas o mejorías importantes.

Se hace énfasis en 6% de los casos en donde el proceso de curación clínica fue aparente.

Se confirma que neurocisticercosis es un padecimiento crónico generalizado, en el que la evolución se hace por períodos de actividad, alternando con períodos de recesión.

Se condena el uso de testigos y se sugiere para ulteriores investigaciones el que se sigan amplias series de casos durante largo lapsos.

Se insiste en que el mejor tratamiento de la enfermedad es la profilaxis.

Palabras clave: Neurocisticercosis, quimioterapia, prazicuantel, resultados 10 años, curaciones aparentes.

Summary

Chemotherapy for neurocysticercosis was born logically because of the scant success of surgery, which is generally palliative, not curative. Prazicantel is the only drug about which serious of more than 100 cases, and follow-up of more than 2 years, have been published. Its use has become universal, reason enough for this theme to be addressed. This paper pretends to contribute to the determination of its therapeutic value in the treatment of neurocysticercosis by means of the clinical and radiologic treatment of 50 sick persons followed up for between 10 (72%) and more than 10 (28%) years.

The patients had been treated with prazicuantel with a dose of 50 mg per kilo of body weight during 15 days, 26% received one treatment, 58% received two, and 22%, three or more treatments.

The patients were studied once again clinically and radiologically with computed axial tomography of the cranium and magnetic resonance. Biological testing was done only if activity-suspected cases.

The results showed a rate of 68% clinical cures or important improvement.

Emphasis is made of the 6% of cases in which the clinical cure process was apparent.

It was confirmed that neurocysticercosis is a generalized chronic ailment in which evolution is achieved by means of periods of activity alternating with periods of recession.

The employment of witnesses is not advised, and it is suggested for later investigation that ample series of cases be followed-up over long periods of time.

It is insisted upon that the best treatment for the illness is prophylaxis.

Key Words: Neurocysticercosis, chemotherapy, prazicuantel, ten-year results, apparent cures.

* Hospital General de México, SSA.

** Centro de Referencia para el Diagnóstico de Enfermedades Transmisibles.

Correspondencia y solicitud de sobretiros: Dr. Clemente Robles, Dirección postal Tabasco #294-6° piso, 06700 México, D. F.

La cisticercosis es un grave problema de salud pública como lo demuestran los siguientes hechos:

1. Amplia distribución geográfica. En América Latina prevalece en México, todo Centro América (especialmente Nicaragua), Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Haití e incluso en los Estados Unidos en donde se registran ya centenares de casos que han sido llevados por inmigrantes provenientes de los países afectados. En Asia: Corea, China, los países del Sudeste y la India. En África: países de la Cuenca Mediterránea y en Sud África. Hasta en la civilizada Europa persisten naciones como España, Grecia, los Balcanes y Polonia; Oceanía en Indonesia.
2. Alta frecuencia. Tan sólo en México se señala que en el 2.5% de las autopsias realizadas en hospitales públicos, se ha detectado la presencia de cisticercos, de los cuales cuando menos la mitad, ha tenido manifestación clínica.^{3, 12, 17, 18}
De acuerdo con estas cifras es posible calcular que en nuestro país existen cuando menos dos millones de portadores de los cuales la mitad manifiestan síntomas clínicos.¹²
3. Alta gravedad. Si se abandona la enfermedad a sí misma, la mortalidad es cuando menos del 50%, cabe destacar que algunos autores señalan 80%.¹⁴
4. Las malas condiciones de salubridad, común a los países del tercer mundo, (falta de agua potable, de drenaje, miseria, ignorancia, etc.), son las causas de esta gran incidencia. Se sabe que la enfermedad es de origen fecal y que las materias fecales no son tratadas adecuadamente por carencia de plantas de tratamiento de las aguas negras; esto inclusive en las más grandes ciudades del país como México, Guadalajara, Monterrey, etc.
5. Falta de control sanitario de la carne de cerdo que se expende en pequeños poblados y rancherías.
6. Las aguas negras urbanas contaminan, entre otros dos importantes ríos del país como son el Tula y el Lerma, cuyas aguas son utilizadas para el riego de superficies agrícolas destinadas a la producción de verduras que son llevadas al mercado en pésimas condiciones higiénicas.

7. La clínica neurológica señala como la causa más frecuente de alteraciones, a la cisticercosis, que puede dejar además de la incapacidad funcional que van desde la ceguera hasta trastornos emocionales y psíquicos graves, pasando por parálisis y hasta invalidez definitiva.^{23, 26}
8. Finalmente cabe recordar que la cisticercosis porcina es causa de grave pérdida económica para los criadores de cerdos.

El profesor Isaac Ochoterena del Instituto de Biología estudió la cisticercosis en México demostrando la existencia de la enfermedad entre nosotros.²⁰

En 1937, fundamos en el pabellón 7 del Hospital General, el Primer Servicio de Neurocirugía en el país.

Nuestra primera publicación versó sobre 100 casos de "tumor" cerebral operados y señaló que el 25% de los casos de "tumor" fueron en realidad masas parasitarias de *cisticercus celulosae* que originaban cuadros de masa ocupativa.²² Este estudio evidenció la frecuencia de la enfermedad en México.

Se inició a continuación la etapa de tratamiento quirúrgico de la enfermedad, en la que pusimos en práctica todos los procedimientos conocidos; craneotomía posterioro supratentorial, con la meta de hacer la extirpación "total" de los parásitos; descompresivas del tipo Cushing; derivativas primero al sistema urinario y a la pleura; después la de Torkidsen a la cisterna magna y finalmente a la cavidad atrial del corazón o al peritoneo, estos dos últimos forman ya parte de los recursos del cirujano para mejorar la hipertensión intracraneana en los casos de hidrocefalia.³⁴

Merece especial mención el trabajo que publicamos en 1966 sobre el uso de la Sonda de Prudden.²²

Los resultados de esta etapa quirúrgica aparecen en los cuadros I, II, III y en las gráficas 1, 2, 3.

Es notorio que en general son poco satisfactorios y más paliativos que curativos. Esto se debe fundamentalmente a que las lesiones son múltiples, confrecuenciabilaterales, infra o supratentoriales simultáneamente, lo que convierte a muchas operaciones quirúrgicas en recursos obsoletos.

En vista de estas circunstancias y teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad, dirigimos

nuestros esfuerzos a encontrar un agente de terapia médica que fuese capaz de llegar simultáneamente a todas partes del cerebro, que no fuese tóxico y sin efectos secundarios, cancerígenos o genéticos.

El fármaco ideal pareció ser el Prazicuantel (pirazino isoquinoleína), por sus virtudes demostradas experimental y farmacológicamente.¹³

Es importante recordar los trabajos del doctor Manuel Chavarría y Chavarría, médico veterinario y zootecnista, quien destacó que el Droncit (Prazicuantel) es capaz de matar los cisticercos en el cerdo.⁸

Este antecedente experimental muy valioso, nos autorizó a ensayar dicho medicamento en el hombre.

En junio de 1979, hicimos el tratamiento a un niño de 6 años de edad que se encontraba en situación desesperada, afectado de cisticercosis generalizada con grave hipertensión intracraneana, edema papilar, crisis convulsivas y severo ataque al estado general.

Los resultados fueron exitosos y el caso fue presentado a la Academia Nacional de Medicina en noviembre de 1979 y publicado en la revista Salud Pública de México y en la Gaceta Médica de México.^{24, 25} (Figuras 6 - 15).

Este caso inicia el tratamiento de la neurocisticercosis por medio de agentes quimioterápicos.

Posteriormente aparecieron otras drogas con eficacia letal sobre el parásito, pero desgraciadamente hasta la fecha, las series publicadas adolecen de dos limitantes: ser cortas, menos de 100 casos y su seguimiento no ha llegado a los dos años, lo que nos permite considerar sus resultados como provisionales aunque promisorios.^{4, 5}

En atención a que la cisticercosis es un padecimiento crónico, de evolución larga, que puede durar muchos años, aun toda la vida, pensamos que es indispensable hacer el seguimiento de los casos por períodos de tiempo adecuados (cinco años mínimo).

La finalidad de este trabajo es contribuir a establecer el valor terapéutico del Prazicuantel en el tratamiento de la neurocisticercosis.

Cuadro I. Mortalidad en operaciones craneales para tratamiento de las diversas formas clínicas de cisticercosis cerebral 1938-1958*

Número de operaciones	80
Mortalidad	48
porcentaje	60

* Servicios de Neurología y Neurocirugía del Hospital General de México. Pabellón 7.

Cuadro II. Operaciones: Droncit en Ventrículo Auricular: 40

Resultados inmediatos.	40 Casos	%
Muerte	4	10
Sobrevivida	36	90
Mejoría de hipertensión intracraneana	33	82.5
Mejoría notable en cuadro ocular (Agudeza y campos visuales)	17	42.5
Mejoría discreta del cuadro ocular	1	12.5
Sin mejoría del cuadro ocular	14	35
Desaparición del edema papilar	28	70
Persistencia del edema papilar	1	2.5
Empeoramiento del cuadro de hipertensión intracraneana	2	5

* Hospital General SSA Segunda Serie 1958-1966 Pabellón 32 un cuadro de Neurología y Neurocirugía

Cuadro III. Intervenciones: 138

Tratamiento quirúrgico	
Derivaciones	107
Intervenciones descompresivas	7
Intervenciones radicales	24
Resultados inmediatos	
Mortalidad	23%

* Hospital General SSA. 1966-1980 Pabellón 32. Unidad de Neurología

Material

Esta formado por 50 enfermos seleccionados del lote de 610 pacientes a los que se refirieron nuestros trabajos anteriores tratados en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales y en el Hospital General de México entre 1979 y 1985, ahora después de un seguimiento de 10 o más años.

GRAFICAS 1, 2, 3

RESULTADOS, CURACIONES Y MEJORIAS +++

MORTALIDAD

Figura 1. Imagen radiológica de cisticercosis de forma músculo cutánea. Nótese las múltiples calcificaciones que corresponden a parásitos que probablemente llegaron por vía sanguínea.

Figura 2. Cisticercosis cerebral de forma miliar aguda. Las lesiones son originadas por cisticercos que llegaron por vía sanguínea.

A todos los enfermos se les examinó clínica y radiológicamente (tomografía o resonancia mag-

Figuras. Infartos cerebrales consecutivo a lesiones vasculares originadas por cisticercosis.

Figura 4. Infartos cerebrales provocados por neurocisticercosis

netica) y solamente se practicaron estudios inmunológicos o de dosificación de anticuerpos cuando había motivos para presumir actividad en el proceso.

Los pacientes fueron incluidos por orden cronológico de presentación.

Clasificación de las lesiones

A lo largo de nuestros estudios sobre cisticercosis y Prazicuantel, hemos seguido respecto a la clasificación de los casos, la ideada por Costero⁷ basada en la evolución de la enfermedad y la localización de las lesiones en el cerebro.

Figura 5. Neurocisticercosis de forma basal, meninges subaracnoidea. Nótense las ampollas lesiones originadas por alteraciones que impiden inclusive identificar los pares craneanos.

Las formas crónicas, este autor las clasifica en los siguientes subgrupos: Meningeas, parenquimatosas, intraventriculares y mixtas.

Ahora, más de 15 años después y basados en la observación de nuestros enfermos durante un periodo de menos 10 años de evolución, nuestras ideas son distintas.

Pensamos que la neurocisticercosis es una enfermedad generalizada difundida por vía sanguínea, (Figuras 1 y 2) en la que casi todas las lesiones intracraneeanas son mixtas con predominio, o bien, en las meninges o dentro del tejido cerebral.

Es bien sabido que los parásitos penetran al organismo por el tubo digestivo y de allí emigran a su asiento definitivo, cerebro, meninges, ojos, músculos, etc. Esta diseminación se hace por vía sanguínea (arterial), pues el cerebro carece de linfáticos y la propagación por continuidad no ha sido demostrada ni se ve viable desde el punto de vista anatómico (Figuras 1 y 2).

dos

Dosis

50 mg. por kilogramo de peso diariamente durante 10 días.

Número de tratamientos

Un tratamiento a 13 pacientes (26%), dos tratamientos a 26 pacientes (52%) y tres o más tratamientos a 11 pacientes (22%).

Seguimiento

Cuando menos a 10 años, 36 pacientes (72%) más de 10 años a 14 pacientes (28%).

Valoración de los resultados

Para hacer la valoración se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

- 1 Presencia o ausencia de síntomas.
- 2 Necesidad de tomar medicamentos.
- 3 Capacidad de laborar y de ganarse la vida.
- 4 Estudio e interpretación de las imágenes radiológicas.
- 5 Calidad de vida.

Para el efecto se elaboró una tabla con calificaciones de uno a diez:

- 10 "Perfecta".
Asintomático, sin medicamentos, capaz de trabajar y con placa radiológica normal.
- 9 Excelente.
Lo mismo que la anterior. pero con alguna anomalía en las imágenes radiológicas
- 8 Muy buena.

Lo mismo que la anterior pero con necesidad de tomar medicina ocasionalmente.

- 7 Buena.
Necesidad de tomar medicación regularmente y además, con algún defecto físico que limite sus capacidades laborales.

Figura 6. Imágenes radiológicas del estudio practicado al enfermo O. D. L. en junio de 1979, antes del tratamiento.

Figura 7. Amplificación de las imágenes anteriores.

Figura 8. Detalles de la tomografía del caso Número 1. O. D. L.

Figura 9. Fotografía del enfermo O. O. L. a la edad de 6 años 6 meses después de recibir el tratamiento. Primer caso publicado en la literatura mundial.

- 6 Mediocre.
 Con daño físico importante.
 5 a 0 Mala.

Resultados

Los resultados clínicos y radiológicos con curaciones o mejorías muy importantes representaron el 68%. (Ver cuadros IV y V).

En las placas radiológicas previas, las lesiones más frecuentes fueron vesículas en el 48% de los casos, nódulos 36% y calcificaciones en el 50%. Después del tratamiento hay 4 placas radiológicas normales y calcificaciones en el 78%.

Se registraron dos casos de invalidez. Uno en una enferma que sufrió fractura del fémur y otra como complicación de una infección generalizada meningoencefálica después de una operación de revisión de sonda de derivación.

Figura 10. Imágenes de control del enfermo O. O. L. 13 de octubre de 1979. Nótese la desaparición de las lesiones.

En el 6% se puede diagnosticar actividad del proceso después de 10 años o más del tratamiento. (Cuadro VI).

De estos 50 pacientes, 72% fue del sexo femenino y el resto del masculino. La ocupación más frecuente fueron empleados y estudiantes y provenían de las regiones clásicamente de endemia cisticercosa en el centro del país y especialmente el estado de Jalisco.

Discusión

El estudio de estos enfermos fue abierto sin testigos por las siguientes razones:

Los testigos son inútiles en estas series ya que en la actualidad tenemos un conocimiento bastante exacto de la historia natural de la enfermedad, de su morbi-mortalidad y complicaciones en el tratamiento tanto médico como quirúrgico. ^{11, 16, 19, 28}

27, 28, 29, 32, 34

Figura 11. Imágenes radiológicas del enfermo O D L cinco años después. Nótese la aparición de calcificaciones en distinto lugar de las lesiones originales.

Figura 12. Imágenes radiológicas del 2 de febrero de 1995. Nótese la aparición de lesión calcificada en lugar diferente a las iniciales.

Figura 13. Imágenes radiológicas del 2 de febrero de 1995. Nótese la aparición de lesión calcificada en lugar diferente a las iniciales.

Figura 14. Imágenes radiológicas del 2 de febrero de 1995. Nótese la aparición de lesión calcificada en lugar diferente a las iniciales.

Tomando en cuenta que la *Taenia solium* solamente vive, crece y madura en el intestino del hombre, la experimentación en animales de laboratorio es prácticamente imposible, especialmente en la variedad nerviosa del padecimiento.

Por tanto, si el uso de testigos viola las normas éticas de la investigación en seres humanos, el único camino que queda para la valoración terapéutica del Prazicuantel, es el seguimiento de aquellas series de enfermos durante largos períodos de tiempo.

En nuestra pequeña serie de 50 casos pero seguida durante diez o más años, aparecen tres con indudable actividad actual, que hasta hace cinco años fueron clasificados como "curados" cuando en realidad la curación era aparente. (Cuadros VII, VIII).

El uso de testigos es además de insuficiente, peligroso, violatorio de las normas éticas establecidas.^{6, 9, 10} (Figuras 3, 4, 5).

Figura 15. Fotografía del enfermo O. O. L. 17 años después.

No es difícil atribuir esta reactivación a un proceso de reinfestación; sin embargo tomando en cuenta el grado de educación y de cultura de estos tres enfermos, esta explicación resulta demasiado simplista y podría ser equivocada, ya que los tres pacientes señalados aseguran haber seguido fielmente las reglas de higiene que en su oportunidad les fueron indicadas.

Conviene recordar que existe un reporte⁴⁵ de 450 soldados británicos que contrajeron la neurocisticercosis en ultramar, que fueron debidamente tratados, clasificados como curados y luego repatriados. En esta serie a lo largo de los años, se fueron señalando recaídas en un medio donde toda reinfestación resulta difícil, por no existir en Inglaterra las condiciones necesarias para ello.

Esto nos obliga a buscar otra explicación a las aparentes curaciones en enfermos que incluso hasta los cinco años de observación parecían curados.

Cuadro IV. Tratamiento quimioterápico 10 años después

Resultados		
Extraordinario (placa normal)	4	68%
Excelente	16	
Muy buenos (toman medicina ocasionalmente)	14	
Buenos (toman medicina regularmente)	8	
Mediocres	2	
Malos (infección sonda)	1	
Reactivación	3	
Invalidez	2*	

* Uno a consecuencia de infección de la sonda de derivación y otro consecutivo a fractura de CLE O

Cuadro V. Síndromes residuales

Convulsiones (controladas):	
Gran mal	12
Pequeño mal	8
Focales	4
Totales	24
Cefaleas:	
Migraña	5
Atípicas	3
Parálisis	
Invalidez	2*

* Uno a consecuencia de infección de asona y otro consecutivo a fractura del CLE O del fémur.

Nos preguntamos en primer lugar si es posible que el cisticerco o sus larvas, puedan permanecer vivos y activos alojados en el sistema nervioso o en los músculos, sin dar síntomas. Yo no vacilaría en contestar que sí. Esto es posible basado en observación común y corriente que solamente la mitad o la tercera parte de los hallazgos de autopsia corresponden a seres que en vida presentaron sintomatología clínica.^{11, 12}

Otro cuestionamiento sería si es posible que en las placas radiológicas se puedan apreciar imágenes radiológicas positivas en las placas de tomografía o resonancia magnética.

También creo que esto sucede a menudo. En las placas radiológicas de enfermos ya curados es frecuente detectar calcificaciones en lugares distintos o a veces incluso lejanos del sitio en donde aparecieron las imágenes originales; en otras palabras, en las placas primeras no aparecieron los parásitos, únicamente aparecieron en las

mas, cuando las lesiones ya estaban calcificadas. (Figuras 1, 11, 12, 13, 14).

tras tanto no hay ni sintomas, ni imágenes radiológicas positivas. (Figura 1).

Cuadro VI. Tratamiento quimioterápico 10 años después

Aparente curación, casos con actividad 10 años después

Caso No. 1
Cisticercosis
Predominantemente intracerebral
Cinco años bien. Asintomático
Cefalea y crisis convulsivas
Elisa +

Caso No. 2
Cisticercosis mixta
Seis años asintomática
Crisis convulsivas
Elisa +

Caso No. 3
Cisticercosis subaracnoidea
Hidrocefalia derivada
Diez años asintomática
Reactivación inflamatoria
Elisa +

Cuadro VII. Mortalidad, 141 casos con 5 o más años de seguimiento* (12.05%)

Muertes ocurridas a lo largo de 5 años por causas ajenas a la cisticercosis o al tratamiento con Praziquantel

Neumonía basal	2
Alcoholismo crónico	1
Deterioro mental	1
Embolia pulmonar	1
Infarto del miocardio	1
Embolia pulmonar	1
Cáncer mamario	1
Accidente vascular cerebral	1
Total	9

Muertes originadas por causas atribuibles a la neurocisticercosis*

Hipertensión endocraneana por mal funcionamiento valvular	13	9.21
Convulsiones generalizadas	2	1.41
Porendémias chesiva	2	1.41
Total	17	12.05%

Otra observación, las placas simples de cisticercosis muscular o cutánea en que aparecen centenares o hasta millares de cisticercos calcificados, únicamente se muestran estas lesiones cuando los parásitos ya están calcificados y mien-

Cuadro VIII. Tratamiento quimioterápico

Estudio comparativo 1, 2 y 5 o más años de seguimiento

Seguimiento	Un año		2 años		5 o más años	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Curación	37	37	34	34	75	53.19
Mejoría+++	44	44	40	40	35	24.82
Mejoría*	2	2	2	2	3	2.12
Mejoría+	2	2	2	2	1	0.71
Sin cambio	8	8	8	8	8	5.67
Empeorados	2	2	2	2	2	1.41
Defunciones	5	5	12	12	17	12.05
Totales	100	100	100	100	141	99.97

Estas consideraciones nos llevan a afirmar algo que ya hace largo tiempo han descrito otros autores. Spina Franca en Brasil³¹ y Botero en Colombia,² afirman que la neurocisticercosis es un padecimiento que evoluciona por períodos de actividad clínica alternando con otros de recesión.

No es rigurosamente exacta la frontera entre estas distintas formas, y lo que más frecuentemente encontramos son formas mixtas en las que es difícil determinar exactamente a cual de estos grupos pertenece.

Para nosotros, más que enunciar la forma clínica, es establecer el diagnóstico nosológico de neurocisticercosis que a menudo incluso resulta estrecho frente a la realidad de que la enfermedad tiene localizaciones múltiples en diversos lugares del organismo, siendo la más frecuente en algunos países la forma muscular y en otros la nerviosa.

Este concepto se encuentra implícito en las observaciones iniciales de Rim²¹ en Corea que en su serie de 41 enfermos de cisticercosis muscular detectó que 8 de ellos tenían convulsiones, sintoma inconfundible de la participación cerebral.

De manera más explícita se expresa Botero^{1, 2} cuando habla de la presencia de parásitos en distintas etapas de su evolución en distintos lugares del cuerpo de un mismo enfermo. Lo que en su opinión obliga a mayores investigaciones

Por su parte el Profesor Spina Franca^{30, 31, 33} después de minuciosos estudios de líquido

encefalorraquídeo en distintas enfermedades seña- la la similitud de los cambios encontrados en pacien- tes con neurocisticercosis y en otros de naturaleza sistémica tan distintas como pueden ser la neurosífilis y la esclerosis múltiple.

Conclusiones

Del estudio de nuestra serie de 50 casos pero seguida durante diez o más años, podemos concluir:

1. Que el Praziquantel es muy útil contra la neurocisticercosis con curaciones o mejorías muy importantes hasta del 68% de los casos. Muchos de estos salvaron la vida gracias al Praziquantel.
2. Que la enfermedad se comporta como un padecimiento esencialmente generalizado y crónico que evoluciona por periodos de actividad alternando con periodos de silencio.
3. Que los cisticercos o sus larvas pueden permanecer largo tiempo en el Sistema Nervioso Central sin dar síntomas o imágenes radiológicas positivas para el diagnóstico.
4. Que es inútil recurrir al uso de testigos por las razones indicadas.
5. Que existen todavía puntos oscuros en el estudio de esta parasitosis que obligan a continuar su estudio e investigación.
6. Que la quimioterapia de la cisticercosis no es la mejor solución del problema, sino la medición preventiva y la profilaxis.

Comentarios finales

A partir de las cifras de mortalidad y de mejoría que aparecen en las figuras y los cuadros, podemos señalar que:

La gráfica número 1 que muestra los resultados obtenidos entre 1980 y 1985 en 141 casos clínicos, nos permite observar que a los 5 años las curaciones y las mejorías alcanzaron hasta el 77% de los casos y la mortalidad que aparece en el cuadro III, es del 12.5%, es decir, la mitad de lo mejor que ofrece la cirugía (Véanse también los cuadros VII y VIII).

El estudio de la gráfica 2, señala que las cifras de curaciones o mejorías a los 10 años fue inferior a la que se señala a los 5 años con una reducción que va del 77 al 68% de los casos y que todavía a los 10 años hay 6% de casos con indudable actividad. Es decir, son enfermos que no están curados (Cuadros IV y VI).

La gráfica 3 referente a la mortalidad operatoria, señala que la reducción de la mortalidad es del 60 al 23%, gracias a los procedimientos quirúrgicos, mismos que han influido de manera decisiva en los siguientes tres factores:

- 1 El empleo de procedimientos quirúrgicos de derivación ventrículo atrial con la Sonda de Prudden con los que la mortalidad operatoria bajó del 60 al 33% de todos los casos de neurocisticercosis, pero con una reducción todavía mayor hasta del 10% en los casos de hidrocefalia, (Cuadro II).
- 2 El empleo de procedimientos de diagnóstico más precisos como es la Tomografía Axial Computada, permitió un descenso de la mortalidad de 33 al 23% de los casos (10% menos), lo que señala la importancia de un diagnóstico preciso.
- 3 La introducción de la quimioterapia que permitió un descenso de la mortalidad del 23 al 12.5%, es decir, se mejoró un 50%.

Agradecimientos

Algunas figuras fueron publicadas en los siguientes artículos de Salud Pública de México:

"Época V", vol. 21, no. 6, Págs. 609, 610, 611, figuras 2, 3, 4 y 5
"Época VI" vol. 24 no. 6 Págs 638 640 figuras 1 y 11
Caral. a del n.º mereo espeoia dedioa a la Cst.cercosis vo. 24 no 6 Páq. 590

Su reproducción fue autorizada por el Lic. Carlos Oropeza Ab. noez Editor de la revista Salud Pública de México

Referencias

1. **Botero D, Castaño S.** Cisticercosis Tratamiento con Praziquantel. Tribuna Médica de Colombia. 1981;63:31-36.
2. **Botero D, Castaño S.** Tratamiento de cisticercosis con Praziquantel in Colombia. Am Jour Trop Med Hyg. 1982; 31:811-21.
3. **Briseno CE, Biagi F, Martínez B.** Observaciones sobre 97 casos de autopsia. Prensa Médica Mexicana. 1961;26:193.

- Brutto OH, Sotelo J.** Neurocysticercosis an up to date Review of Infections Diseases 1988 Vol. 10 No. 6 Nov.-Dic.
- Brutto OH, Sotelo J.** Avbendazole therapy for sub arachnoidal ventricular cysticercosis. Jour Neuro Surg. 1990; 72 may.
- Carta de derechos del paciente. Declaración de Lisboa. Bol of Sanit Pan Am 1990;108:5-6.
- Costero I.** Tratado de anatomía patológica. Edit Atlante México 1946 tomo II 1485-1495.
- Chavarría y Chavarría M, Díaz González. Dronciten** en el tratamiento de la cisticercosis porcina. Esp Vet México 1979 1-5-6 160-165.
- Declaración de Helsinki. Recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación biomédica en seres humanos. Bol of Sanit Panam. 1990;108:1-6.
- Declaraciones de Helsinki. Crónica de la O. M. S. 1965;19:30-32.
- Escobar A.** The pathology of neurocysticercosis en palacio et al. Cysticercosis of the Nervous System. C. C. Thomas Springfield Ill. 1933.
- Estañoi B.** Controversias en cisticercosis cerebral. Gac Méd Méx 1983 V 119 No. 11 Nov.
- Forberg H.** Propiedades farmacocinéticas, farmacológicas y toxicológicas del Praziquantel. Salud Pública 1982 XXIV No. Nov. Dic. 605-623.
- Gomez LG, Mejia A.** Tratamiento de la neurocisticercosis con Praziquantel. Neurología de Colombia 1980 4503-509
- Latovitzky N, Abrams G, Mayeux R, Ascher BG, Jr, Sciarra D.** Cerebral cysticercosis. Neurology 1978;28:838-42.
- Lombardo L, Mateos JA.** Cerebral cysticercosis in México. Neurology 1961;11:824-28.
- Mateos H.** Cisticercosis cerebral como problema de salud pública. Gac Méd Mex 1972;103:225-50.
- Mazzoti L.** Datos sobre cisticercosis en México. Rev Inst Salud y Enfermedades Tropicales. 1944;283.
- Nashbit E, Neva FA.** Recent advances in the diagnosis and treatment of cerebral cisticercosis. New Engl J Med 1984;311:1442-46.
- Ochoterena I.** Contribución al conocimiento de la Wistopatología de la cisticercosis cerebral en México. Ann Inst Biol Méx 1936 IV 81-87.
- Rim HJ, Chang Yoo Shin.** Estudios sobre cisticercosis humana y su tratamiento con Praziquantel. Korea University Med Jour 1980;17:3.
- Robles C.** Consideraciones acerca de 100 casos de tumor cerebral operados. Gac Méd Méx 1940;LXX No. 3
- Robles C, Reyes A.** Uso de la sonda de Prudden en el tratamiento de la cisticercosis cerebral. Gac Méd Mex 1966;185:799-812.
- Robles C, Chavarría M.** Presentación de un caso de cisticercosis cerebral tratado médicamente con nuevo fármaco Praziquantel. Salud Pública de México 1979;5: 603-618.
- Robles C, Chavarría M.** Un caso de cisticercosis cerebral curado médicamente con un nuevo fármaco Praziquantel. Gac Méd Méx 1980;116:65-71.
- Robles C.** Tratamiento médico de la neurocisticercosis Gac Méd Méx 1981;117:355-362.
- Robles C.** Resultados tardíos en el tratamiento de la cisticercosis cerebral con Praziquantel. Salud Pública de México 1982;124:625-27.
- Robles C.** Mortalidad en 100 enfermos de neurocisticercosis tratados con Praziquantel. Salud Pública de México 1982;XXIV:(6) Nov. Dic.
- Robles C, Sedano AM, Vargas Tentori N, Galindo Virgen S.** Longterm results of Praziquantel therapy in neurocisticercosis Jour Neuro Surg 1987 66 359-63
- Spina Franca A.** Síndrome líquido da neurocisticercose. Arq Neuro Psiquiat São Paulo 1961;19:307.
- Spina Franca A, Livramento Braschensch LA, García López P.** Cerebro spinal fluid immuno globulins in cysticercosis of the central nervous system. Arq Neuro Psiquiat 1978;34:40.
- Spina Franca A, Nobrega JSP.** Cisticercose e Praziquantel Rev Paul Med 1980;95:34.
- Spina Franca A, Rezende de G.** Alteraciones del líquido cefalorraquídeo con el Praziquantel Salud Pública de México 1982; época VI vol XXIV No. 6 Nov.-Dic.
- Vargas Tentori N.** La cirugía en casos de neurocisticercosis tratados con Praziquantel. Salud Pública de México 1982;24:661